

# BLADGJØDSEL



# FOLIO B

**grönn**  
gjødse



10 kg

## Folio B – Bladgjødning til bruk ved mangel på bor


Ferdig formulert bladgjødning til bruk mot bormangel ved sprøyting på bladverket i grønnsaker, frukt, belgfrukter og korn. Folio B er en økologisk bladgjødning som brukes ved mangel på bor. Folio B brukes etter en bladanalyse eller som forebyggende før perioder med økende mineralbehov. Slike perioder er ved blomstring, fruktsetting eller under sterk vekst og utvikling. Folio B inneholder høy konsentrasjon av bor i kombinasjon med en dispergent, som sørger for at mineralet får god kontakt med bladoverflaten, og veksten får god mulighet til å ta det opp. Dispergenten er laget av plantemateriale og er organisk omsettbart. For best å hjelpe vekstene ut av en mineralmangel er Folio B tilsatt energi i form av en bladgjødning (Pepton). Folio B tas opp i vekstene i løpet av noen timer og virkningen kan være synlig allerede samme dag. Folio B leveres i pulverform og skal blandes ut med vann, og kan brukes sammen med andre typer bladgjødning eller plantevernmidler. Folio B er et økologisk godkjent korrektiv.

Avling	Målsetting	Anbefaling
Eple	Styrker vekst og utvikling	Før blomstring ved fare for mangel, ellers etter avblomstringen er ferdig. Kan gjerne gjentas etter 10-14 dager, men ikke etter at blader er felt.
Potet	Styrker vekst og utvikling	Brukes en uke etter full oppspiring, gjenta en gang etter 14 dager, osv. Kan gjentas inntil 2-3 uker etter danning av knoller.
Salat på friland	Styrker vekst og utvikling	10-14 dager etter planting/oppspiring. Ved moderat mangel gjenta med 10-14 dagers intervall.
Kål	Stimulere begynnende hodedanning. Spesielt ved lav jordtemperatur.	Fra 4-bladstadiet. Gjentas med 10 til 14 dagers intervaller ved middels mangelsymptom.
Bringebær	Styrker vekst og utvikling	Første behandling når knoppene er grønne, andre når de er hvite. Plantene kan også behandles etter høsting.



### Analyse

Bor (B)	11,2 %
Pepton	20 %
Organisk karbon	4 %



### Innhold

Alle aminosyrer (i Pepton delen) er av type L	
Alanine	Threonine
Lysine	Glicine
Arginine	Tryphophan
Methionine	Histidine
Aspartic acid	Tyrosine
Phenylalanine	Isoleucine
Cysteine	Valine
Serine	Leucine
Glutamic acid	Proline



### Anbefaling

Blandes i vann etter ønsket dosering, etter erfaring, jord- eller bladanalyse.  
50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar.

**grønn**  
gjødning

GRØNN GJØDSEL AS

Strømfossveien 470  
1890 Rakkestad

[www.gronngjodsel.no](http://www.gronngjodsel.no)

+47 92 48 50 00