



Agroleaf Liquid B-10 er en flytende gjødsel med bor (B) i form av boretanolamin. Den brukes til å forhindre og, om nødvendig, korrigere endringer forårsaket av mangel eller ubalanse i assimileringen av dette mikronæringsstoffet. Det kan påføres tre- og urteaktige avlinger via blad- og / eller rotapplikasjoner.

Agroleaf Liquid Man Z + er en bladspray som brukes forebyggende i dyrkbare avlinger, er det tilrådelig å utføre Man Z + -behandlinger i perioden med størst vegetativ vekst. I frukttrær anbefales det under igangsetting og ved sterk utvikling, for å unngå full blomst. Når den påføres ved befruktning, anbefales Man Z + for bruk som en forebyggende applikasjon.

### Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye teknologien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overflatespenning og sprer næringsstoffer optimalt over bladene. Dette resulterer i et større dekket område for næringsopptak.
2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanddråper til bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.
3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langvarig ernæring og forbedrede utnyttelse.



#### Analyse

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nitrogen Total (N)      | 0 %     |
| Fosfor Pentoksid (P2O5) | 0 %     |
| Kaliumoksid (K2O)       | 0 %     |
| Bor                     | 10,00 % |



#### Innhold

Agroleaf Liquid B-10 er en flytende gjødsel med bor (B) i form av boretanolamin. Ikke bland med mineraloljer, mangan-sulfat, sink-sulfat eller med sulfokalsiske forbindelser, syrer eller sterke baser. En test bør utføres, eller din rådgiver bør konsulteres for å fastslå kompatibiliteten til bestemte blandinger.



#### Anbefaling

For avlinger som er spesielt følsomme for mangel på bor, anbefales en forebyggende rot- eller bladpåføring, og fordekker den angitte dosen i 2 eller 3 porsjoner. Ved busker og trær er det tilrådelig å utføre forebyggende behandlinger etter blomstring og fruktsetting, sammenfallende med begynnelsen av økningen av større utvikling, og i dyrkbare avlinger, i de innledende fasene med større vegetativ vekst. I tilfelle mangel, må 2 eller 3 påfølgende bladpåføringer av B-10 utføres med intervaller på 15-20 dager, og fortsett, om nødvendig, å påføre doser via røttene.

Pakning 10 liter