



Agroleaf Special Sink er et førsteklasses fullt vannløselig bladgjødsel, mye brukt i jordbruk og hagebruk for å forhindre og kontrollere sinkmangel i et bredt utvalg av avlinger, som korn, grønnsaker, blomster og frukttrær.

Agroleaf Special Sink er et førsteklasses fullt vannløselig bladgjødsel, mye brukt i jordbruk og hagebruk for å forhindre og kontrollere manganmangel i et bredt utvalg av avlinger, som korn, grønnsaker, blomster og frukttrær.

Agroleaf Special inkluderer X3 som forbedrer næringsopptaket.

- Bladgjødsel med Agroleaf Special Zn muliggjør rask absorpsjon av plantene, derav fysiologisk stress fra plantene på grunn av sinkmangel slutter innen en dag eller to.
- Normal ytelse av avlingen gjenopptas snart.
- Den oppløses raskt og totalt, slik at klargjøring av løsningen er enkel og problemfri.
- Agroleaf Special Zn forbedrer stoffskiftet.
- Produktet inneholder også X3 Active, en spesifikk

aminosyre som letter absorpsjonen av denne forbindelsen i planteblater og derfor gir et effektivt opptak.

- EDTA er et kraftig chelateringsmiddel, som kan beskytte metallatomet som er kompleksbundet med det, mot utfelling og inaktivering under forhold som ellers ville forårsaket at metallatomet ikke var tilgjengelig for plantene.
- Agroleaf Special Zn er produsert av de beste råvarene, av de fleste moderne produksjonsteknologier. Den har den høyeste konsentrasjonen av aktiv forbindelse blant produkter av sitt slag.
- Agroleaf Special Zn kan blandes i tanker med et bredt spekter av andre gjødsel og plantebeskyttelsesmidler.
- Ved dette kan produsenten spare på feltoperasjoner, og kan løse sinkmangel, samtidig som han bekjemper ulike skadedyr og sykdommer.



Analyse

Nitrogen	0 %
Fosfor	0 %
Kalium	0 %
Sink	14 %



Innhold

Agroleaf Special Sink er et førsteklasses fullt vannløselig bladgjødsel, mye brukt i jordbruk og hagebruk for å forhindre og kontrollere manganmangel i et bredt utvalg av avlinger, som korn, grønnsaker, blomster og frukttrær.



Anbefaling

Best tid for bladgjødsling er sen ettermiddag/kveld. Unngå vannstressede avlinger, lav relativ luftfuktighet, høy temperatur, forventes nedbør innen 3 dager. Nedbør innen 4 timer etter sprøyting, bør avlingen sprayes påny om 3-4 dager. Prøv endelig konsentrasjon på en lite felt med flere planter en uke før. Sjekk for uønskede resultater, særlig når blandes med andre stoffer. Bruk sprøyte som gir trykk som produserer fine dråper. Fyll beholderen til halv; start blanding. Legg all gjødsel i tanken og vent på oppløsning. Sjekk at pH er mellom 4 og 6,5, korrigjer om nødvendig. Legg hele tiltenkt mengdens oppdrepende midler og / eller insektmidler i. Korrigjer evt. pH ved å tilsette svært små mengder Nova Pekacid eller NaOH. Fyll sprøytebeholderen til full kapasitet. Begynn med en gang og stopp ikke før tom tank. Oppbevar ikke oppløsningen over natten.

Pakning 6 x 2 kg